



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ КАЛИЯ ОРОТАТ

Торговое название препарата: Калия оротат

Действующее вещество (МНН): калия оротат

Лекарственная форма: таблетки

Состав:

активное вещество: калия оротат

вспомогательные вещества: сахар молочный (лактоза), натрий-карбоксиметилцеллюлоза очищенная (кармеллоза натрия), крахмал картофельный, аэросил (окись кремния) кислота стеариновая или кальция стеарат.

Описание: таблетки белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: стимуляторы трофики тканей и регенерации

Код АТХ: A05BA

Фармакологические свойства

Оказывает анаболическое действие и способствует стимуляции процессов регенерации. Обеспечивает синтез пиримидиновых нуклеотидов, входящих в состав нуклеиновых кислот, участвующих в образовании белковых молекул. В связи с этим оротовая кислота и ее соли применяются при нарушениях белкового обмена, как общие стимуляторы обменных процессов.

Показания к применению

Заболевания печени, вызванные острыми и хроническими интоксикациями (за исключением циррозов печени с асцитом), дистрофия миокарда, алиментарная и алиментарно-инфекционная дистрофия у детей, прогрессирующая мышечная дистрофия, физические перегрузки. Иногда препарат используют при аритмиях (особенно экстрасистолы и мерцательной аритмии).

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь за 1 час до еды или через 4 часа после нее. Доза для взрослых от 0,5 г до 1,5 г в день (по 0,25 г - 0,3 г 2-3 раза в день).

Курс лечения 20-40 дней, а в некоторых случаях и дольше. При необходимости повторяют курс лечения после месячного перерыва. В отдельных случаях в зависимости от эффективности и переносимости препарата суточную дозу для взрослых увеличивают до 3 г.

Детям (при алиментарной и алиментарно-инфекционной дистрофии, анемиях по 10-20 мг/кг в 2-3 приема. Курс лечения 3-5 дней.

Побочные действия

Препарат обычно хорошо переносится. В отдельных случаях возможны аллергические дерматозы, быстро проходящие после отмены препарата (при необходимости назначают противогистаминные препараты) и диспепсические явления.

Противопоказания

Цирроз печени с асцитом, нефроуролитиаз, почечная недостаточность, повышенная чувствительность к препарату.

С осторожностью: Период беременности и лактации.

Лекарственные взаимодействия

Затрудняет усвоение железа, тетрациклина, натрия хлорида (интервал между приемами лекарственного средства – не менее 2-3 часа). Пероральные контрацептивы, диуретики, миорелаксаты, инсулин снижают эффект препарата.

Особые указания

Препарат назначают под контролем уровня калия в крови. Нельзя применять препарат как калийзамещающий препарат.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Препарат не оказывает влияние на управление транспортным средством и потенциально опасными механизмами.

Форма выпуска

Таблетки по 500 мг.

Условия хранения

В сухом месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель

ООО «RADIKS»

Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств

ООО «RADIKS»,

Республика Узбекистан, 100054, г. Ташкент, ул. Лутфий, 50

Тел: (+99871) 273-43-98, факс: (+99871) 273-80-58

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА КАЛИЙ ОРОТАТ

Препаратнинг савдо номи: Калий оротат

Таъсир этувчи модда (ХПН): калий оротат

Дори шакли: таблетка

Таркиби:

фаол модда: калий оротат

ёрдамчи моддалар: сут қанди (лактоза), тозаланган натрий-карбоксиметилцеллюлозаси (натрий кармеллозаси), картошка крахмали, аэросил (кремний оксиди) стеарин кислотаси или кальций стеарати.

Таърифи: оқ рангли таблеткалар.

Фармакотерапевтик гуруҳи: тўқималар трофикаси ва регенерациясини рағбатлантирувчи воситалар

АТХ коди: A05BA

Фармакологик хусусиятлари

Анаболик таъсир кўрсатади ва регенерация жараёнларини рағбатлантирилишига ёрдам беради. Оксил молекулаларининг ҳосил бўлишида қатнашувчи нуклеин кислоталарининг таркибига кирувчи пиримидин нуклеотидларининг синтезини таъминлайди. Шу сабабли оротат кислотаси ва унинг тузлари модда алмашинув жараёнларининг умумий рағбатлантирувчилари сифатида оксил алмашинувининг бузилишларида қўлланади.

Қўлланилиши

Ўткир ва сурункали интоксикациялар чақирган жигар касалликлари, (асцит билан бўлган жигар циррозидан ташқари), миокарднинг дистрофияси, болалардаги алиментар ва алиментар – инфекцион дистрофия, зўрайиб бораётган мушак дистрофияси, жисмоний юкламалар.

Препаратни баъзида аритмияларда (айниқса экстрасистолияда ва липиловчи аритмияларда) қўлланилади.

Қўллаш усули ва дозалари

Препаратни ичга, овқатдан 1 соат олдин ёки 4 соат кейин қабул қилинади. Катталар учун дозаси кунига 0,5 дан -1,5 г гача (0,25–0,3 г дан кунига 2-3 марта). Даволаш курси 20–40 кун, айрим ҳолларда ундан давомлироқдир. Зарурати бўлганида даволаш курси 1 ойлик танаффусдан кейин такрорланади. Алоҳида ҳолларда препаратни самардорлиги ва ўзлаштирилишига қараб суткалик дозани катталар учун 3 г гача ошириш мумкин. Болаларга (алиментар ва алиментар-инфекцион дистрофияда, анемияларда) – суткада 10–20 мг/кг дан (2-3 қабулга). Даволаш курси 3-5 кун.

Ножўя таъсирлари

Препарат одатда яхши ўзлаштирилади. Алоҳида ҳолларда препарат бекор қилингандан кейин тез ўтувчи аллергия реакциялар (зарурати бўлганида гистаминга қарши препаратлар буюрилади) ва диспептик ҳолатлар бўлиши мумкин.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Асцит билан бўлган жигар циррози, нефроуролитиаз, буйрак етишмовчилиги, препаратга юқори сезувчанликда қўллаш мумкин эмас.

Эҳтиёткорлик билан – ҳомиладорлик ва лактация даври.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Темир, терациклин, натрий хлоридининг ўзлаштирилишини қийинлаштиради (дори воситасини қабуллари орасидаги интервал – камида 2 – 3 соат). Перорал контрацептивлар, диуретиклар, миорелаксантлар, инсулин препаратларининг самарасини пасайтиради.

Махсус кўрсатмалар

Препарат қондаги калий даражасини назорат қилиш остида буюрилади. Препаратни калий ўрнини босувчи дори сифатида ишлатманг.

Автомобилни ва мураккаб механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири

Препарат транспорт воситасини бошқаришга ва потенциал хавфли механизмларга тасир қилмайди.

Чиқарилиш шакли

500 мг дан таблеткаларда.

Сақлаш шароити

Қуруқ жойда, 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Болалар олаолмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилиқ муддати

3 йил.

Яроқлилиқ муддати ўтгач қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецепт бўйича.

Ишлаб чиқарувчи:

“RADIKS” МЧЖ

Дори воситаларини сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили

"RADIKS" МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси, 100054, Тошкент ш. Лутфий кўч., 50

Тел: (+99871) 273-43-98, факс: (+99871) 273-80-58