



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕВОМЕКСИД

Торговое название препарата: Левомексид

Действующее вещество (МНН): хлорамфеникол, метилурацил

Лекарственная форма: мазь

Состав:

активное вещество: хлорамфеникол - 0,75 г, метилурацил – 4 г;

вспомогательные вещества: полиэтиленоксид 400, полиэтиленоксид 1500.

Описание: мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Антибиотик (группа хлорамфеникола)

Код АТХ: D06C

Фармакологические свойства

Хлорамфеникол (синоним Левомецетин) оказывает антимикробное действие. Механизм противомикробного действия связан с нарушением синтеза белков микроорганизмов. Действует бактериостатически. Активен в отношении грамположительных (стафилококки и стрептококки) и грамотрицательных (гонококки, менингококки) кокков, многих бактерий (кишечная, синегнойная и гемофильная палочки, сальмонеллы, шигеллы, клебсиеллы, серрации, иерсинии, протей), риккетсий, спирохет, некоторых крупных вирусов. Препарат активен в отношении штаммов, устойчивых к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам. Легко проникает в ткани без повреждения биологических мембран. В присутствии гноя и некротических тканей антибактериальное действие препарата сохраняется.

Метилурацил ускоряет процессы клеточной регенерации, оказывает также противовоспалительное и фотозащитное действие.

Полиэтиленгликоль обладает дегидратационным действием, в десятки раз превосходящим действие гипертонического раствора поваренной соли.

Показания к применению

Лечение инфицированных ран (в первой, гнойно-некротической фазе раневого процесса), фурункулов и других гнойных поражений кожи, длительно незаживающих трофических язв, ожогов II и III степени.

Способ применения и дозы

Мазь Левомексид предназначена для наружного применения взрослым и детям в возрасте старше 3 лет.

После стандартной обработки раны (механическое удаление некротических тканей, промывание раствором перекиси водорода) её рыхло наполняют стерильными марлевыми салфетками, пропитанными мазью. Возможно введение препарата в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этих случаях мазь предварительно подогревают до 35-36°C. перевязки производят ежедневно до полного очищения раны от гнойно-некротических масс. При больших раневых поверхностях суточная доза мази в пересчете на хлорамфеникол не должна превышать 3 г.

Длительность лечения зависит от тяжести и особенностей течения заболевания. Мазь Левомексид не рекомендуется использовать длительно. Не следует применять мазь более 5 дней без назначения врача.

Дети

Не применять препарат детям в возрасте до 3 лет.

Побочные действия

Аллергическая реакция в виде кожных высыпаний. В этом случае применение препарата прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, псориаз, экзема, грибковые поражения кожи; патология системы крови в анамнезе, включая миелосупрессию и апластическую анемию, детский возраст до 3-х лет.

Особые указания

Препарат предназначен только для наружного применения.

Длительное применение препарата может привести к сенсibilизации, сопровождающейся развитием реакции повышенной чувствительности при дальнейшем применении хлорамфеникола наружно или в виде лекарственных форм системного действия. В случае необходимости продолжения терапии более 5 дней рекомендуется повторная оценка локального статуса и общего состояния пациента. После местного применения хлорамфеникола возможна его системная абсорбция, что при длительном воздействии может привести к токсичности. Не допускать попадания мази в глаза.

Дети

Применение мази Левомексиды противопоказано у детей до 3 лет.

Применение лекарственного средства у детей необходимо осуществлять под наблюдением врача.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение препарата при беременности возможно только в случае, если польза для матери превышает риск для плода.

Хлорамфеникол выделяется с грудным молоком. В период лактации следует либо прекратить применение препарата, либо кормление грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Не влияет на способность управлять автотранспортными средствами и работать с другими сложными механизмами.

Передозировка

При передозировке могут усиливаться побочные реакции лекарственного средства. Длительное (более 5-7 суток) наружное применение часто приводит к контактной сенсibilизации.

Терапия - симптоматическая.

Лекарственные взаимодействия

Нежелательно одновременное применение с препаратами, угнетающими кроветворение (сульфаниламидами, цитостатиками, производными пиразолина), с дифенилом, барбитуратами, этанолом.

Форма выпуска

Мазь в тубах по 20 г, 25 г, 40 г вместе с инструкцией по медицинскому применению.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Препарат хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель:

ООО «RADIKS»,

Республика Узбекистан, 100054, г. Ташкент, ул. Лутфий, 50.

Тел: (+99871) 273-92-31, факс: (+99871) 273-80-58.



Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

ООО «RADIKS»,

Республика Узбекистан, 100054, г. Ташкент, ул. Лутфий, 50.

Тел.: (+99871) 273-43-98, факс: (+99871) 273-80-58.

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА ЛЕВОМЕКСИД

Препаратнинг савдо номи: Левомексид

Таъсир этувчи модда (ХПН): хлорамфеникол, метилурацил

Дори шакли: суртма

Таркиби:

фаол модда: хлорамфеникол - 0,75 г, метилурацил – 4 г;

ёрдамчи моддалар: полиэтиленоксид 400, полиэтиленоксид 1500.

Таърифи: оқ ёки сарғиш тусли оқ рангли суртма.

Фармакотерапевтик гуруҳи: Антибиотик (хлорамфеникол гуруҳи)

АТХ коди: D06C

Фармакологик хусусиятлари

Хлорамфеникол (синоними Левомецетин) микробларга қарши таъсир кўрсатади. Микробларга қарши таъсир механизми микроорганизмларнинг оксилларини синтезини бузилиши билан боғлиқ. Бактериостатик таъсир кўрсатади. Грамманфий (стафилококклар ва стрептококклар) ва грамусбат (гонококклар, менингококклар) коккларга, кўпчилик бактериялар (ичак, кўкйиринг ва гемофил таёқчалари, сальмонеллалар, шигеллалар, клебсиеллалар, серрациялар, иерсиниялар, протейлар), риккетсиялар, спирохеталар, айрим йирик вирусларга нисбатан фаол. Пенициллин, стрептомицин, сульфаниламидларга чидамли штаммларга нисбатан фаол.

Метилурацил хужайра регенерацияси жараёнларини тезлаштиради, яллиғланишга қарши ва фото химояловчи таъсир кўрсатади.

Полиэтиленгликоль ош тузининг гипертоник эритмасининг таъсирига қараганда ўн марта кўпроқ дегидратацион таъсирга эга.

Қўлланилиши

Инфекцияланган жароҳатлар (шикастланиш жараёнининг биринчи йирингли-некротик босқичида), фурункуллар ва бошқа йирингли тери жароҳатлари, узок муддат битмайдиган трофик яралар, II ва III даражадаги куйишларни даволашда қўлланади.

Қўллаш усули ва дозалари

Левомексид суртмаси катталар ва 3 ёшдан ошган болалар учун сиртга қўллаш учун мўлжалланган.

Жароҳатга одатдаги ишлов берилганидан кейин (некротик тўқималарни олиб ташлаш, водород пероксиди билан ювиш) суртма билан шимдирилган стерил дока салфеткалар билан жароҳат бўш қилиб тўлдирилади. Катетер (дренаж трубка) орқали йирингли бўшлиқларга шприц ёрдамида препаратни юборилиши мумкин. Бундай ҳолларда суртма олдиндан 35-36°C гача иситилади. Ҳар куни жароҳат йирингли-некротик массалардан тоза бўлгунича боғлов ўтказилади.

Катта яра юзалари учун суртманинг кунлик дозаси хлорамфениколга қайта ҳисобланганда 3 г дан ошмаслиги керак.

Даволашнинг давомийлиги касалликнинг оғирлиги ва хусусиятларига боғлиқ. Левомексид суртмаси узок муддатли фойдаланиш учун тавсия этилмайди. Суртмани шифокор кўрсатмасисиз 5 кундан ортиқ ишлатмаслик керак.

Болалар

Препаратни 3 ёшгача бўлган болаларда қўлланилмасин.

Ножўя таъсирлари

Тери тошмаси кўринишидаги аллергия реакциялар. Бундай ҳолларда препаратни қўллаш тўхтатилади ва десенсибилизацияловчи даволаш ўтказилади.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Препаратнинг таркибий қисмларига индивидуал юқори сезувчанлик, псориаз, экзема, терининг замбуруғли шикастланишлари; анамнезда қон тизимининг патологияси, шу жумладан миелосупрессия ва апластик анемия, 3 ёшгача бўлган болаларда қўллаш мумкин эмас.

Махсус кўрсатмалар

Препарат фақат сиртга қўллаш учун мўлжалланган.

Препаратни узок муддат қўллаш хлорамфениколни сиртга ёки тизимли дозалаш шакллари шаклида қўллаш билан юқори сезувчанлик реакциясининг ривожланиши билан бирга сенсибилизацияга олиб келиши мумкин. Агар терапияни 5 кундан ортиқ давом эттириш зарур бўлса, беморнинг маҳаллий ҳолати ва умумий ҳолатини қайта баҳолаш тавсия этилади. Хлорамфениколни маҳаллий қўллашдан кейин унинг тизимли сўрилиши мумкин, бу эса узок вақт таъсир қилиш билан токсикликка олиб келиши мумкин. Суртмани кўзларга тушишига йўл қўйилмасин.

Болалар

3 ёшгача бўлган болаларда Левомексид суртмасини қўллаш мумкин эмас.

Болаларда дори воситасини қўллаш шифокор назорати остида амалга оширилиши керак.

Ҳомиладорлик ёки лактация даврида қўлланилиши

Ҳомиладорлик пайтида препаратни қўллаш фақат она учун фойда ҳомила учун хавфдан юқори бўлган тақдирдагина мумкин.

Хлорамфеникол она сути билан чиқарилади. Лактация даврида препаратни қўллашни ёки эмизишни тўхтатиш керак.

Автотранспорт воситаларини бошқариш ва механизмлар билан ишлаш

Автотранспорт воситаларини бошқариш ва бошқа мураккаб механизмлар билан ишлаш қобилиятига таъсир қилмайди.

Дозани ошириб юборилиши

Дозани ошириб юборилганда дори воситасининг ножўя реакциялари кучайиши мумкин. Узок муддатли (5-7 кундан ортиқ) сиртга фойдаланиш кўпинча контакт сезувчанлигига олиб келади.

Терапия - симптоматикдир.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Қон ҳосил бўлишини ингибиция қилувчи препаратлар (сульфаниламидлар, цитостатиклар, пиразолин ҳосилалари), бифенил, барбитуратлар, этанол билан бир вақтда қўллаш мақсадга мувофиқ эмас.

Чиқарилиш шакли

Суртма 20 г, 25 г, 40 г дан тубаларда тиббиётда қўлланилишига доир йўриқнома билан бирга.

Сақлаш шароити

Ёруғликдан ҳимояланган, 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Препарат болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилиқ муддати

3 йил.

Яроқлилиқ муддати ўтгач ишлатилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби
Рецепт бўйича.

Ишлаб чиқарувчи:

“RADIKS” МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси, 100054, Тошкент ш., Лутфий кўч, 50.

Тел.: (+99871) 273-92-31, факс: (+99871) 273-80-58.



Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситаларининг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили:

“RADIKS” МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси, 100054, Тошкент ш. Лутфий кўч., 50.

Тел.: (+99871) 273-43-98, факс: (+99871) 273-80-58.