



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛОРИНГОСЕПТ

Торговое название препарата: Лорингосепт

Действующие вещества (МНН): настойка прополиса, аскорбиновая кислота

Лекарственная форма: таблетки

Состав:

1 таблетка содержит:

активные вещества: настойка прополиса – 60 мг, аскорбиновая кислота – 20 мг;

вспомогательные вещества: кислота лимонная, какао, кальция стеарат или кислота стеариновая или магния стеарат, сахар.

Описание: таблетки светло коричневого цвета с вкраплениями, специфического запаха.

Фармакотерапевтическая группа: средства для лечения заболеваний ЛОР органов.

Код АТХ: R02AA

Фармакологические свойства

Аскорбиновая кислота участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов, повышает свертываемость крови, сопротивляемость организма к инфекциям, стимулируя иммунную систему.

Прополис оказывает антимикробное, противозудное, анальгетическое и слабо выраженное противовоспалительное действия. Препарат в целом обладает бактерицидным, усиливающим регенерацию, активизирующим защитные силы организма действиями. Восполняет дефицит витамина С.

Показания к применению

Профилактика и лечение заболеваний верхних дыхательных путей, инфекционно-вирусного и воспалительного характера (ОРВИ, ларингит, фарингит), заболеваний слизистой оболочкой полости рта (пародонтопатия), понижения сопротивляемости организма.

Способ применения и дозы

Сублингвально, до полного рассасывания таблетки во рту, по 1 таблетке 4-10 раз в день в течение 5-15 дней. При необходимости через месяц курс лечения повторяют.

Побочные действия

Возможно аллергические реакции.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость к компонентам препарата, сахарный диабет.

Лекарственные взаимодействия

Не установлены.

Особые указания

При развитии аллергических реакций лечение следует прекратить.

Меры предосторожности

В случае развития аллергических реакций лекарственное средство следует отменить, назначить антигистаминные препараты.

Беременность и период лактации

Безопасность применения препарата у беременных и период лактации не доказана.

Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем или другими техническими средствами.

Передозировка

Симптомы: легкая тошнота.

Лечение: отмена препарата.

Форма выпуска

Таблетки, по 6, 10 в контурно-безъячейковой упаковке, по 10 ячейковой упаковке вместе с инструкцией по медицинскому применению.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Препарат хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не следует использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

ООО «RADIKS»,

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100054, ул. Лутфий, 50.

Тел.: (+99871) 273-92-31, факс: (+99871) 273-80-58.

Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

ООО «RADIKS», г. Ташкент, 100054, ул. Лутфий, 50.

Тел.: (+99871) 273-43-98, факс (+99871) 273-80-58.



ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА ЛОРИНГОСЕПТ

Препаратнинг савдо номи: Лорингосепт

Таъсир этувчи моддалар (ХПН): прополис настойкаси, аскорбин кислотаси

Дори шакли: таблеткалар

Таркиби:

1 таблетка қуйидагиларни сақлайди:

фаол моддалар: прополис настойкаси – 60 мг, аскорбин кислотаси – 20 мг;

ёрдамчи моддалар: лимон кислотаси, какао, кальций стеарати ёки стеарин кислотаси ёки магний стеарати, қанд.

Таърифи: оч-жигарранг рангли, бироз доғлари бўлган, ўзига хос хидли таблеткалар.

Фармакотерапевтик гуруҳи: ЛОР аъзолари касалликларини даволаш учун восита.

АТХ коди: R02AA

Фармакологик хусусиятлари

Аскорбин кислотаси оксидланиш-қайтарилиш жараёнлари бошқарувида иштирок этади, қон ивишини оширади, организмни инфекцияга бўлган қаршилигини, иммун тизимини рағбатлантиради.

Прополис микробларга қарши, қичишишга қарши, оғриқ қолдирувчи ва кучсиз яллиғланишга қарши таъсир кўрсатади. Препарат умуман бактерицид, регенерацияни кучайтирувчи, организмнинг ҳимоя кучларини фаоллаштирувчи таъсир кўрсатади. Витамин С танқислигини тўлдиради.

Қўлланилиши

Юқори нафас йўлларининг инфекцион-вирусли ва яллиғланиш характерли касалликларини (ўткир респиратор вирусли инфекциялар; ларингит, фарингит), оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларини (парадонтит), организмнинг қаршилигини пасайиши профилактикасида ва даволашда қўлланилади.

Қўллаш усули ва дозалари

Сублингвал, оғизда тўлиқ эригунча, 1 таблеткадан кунига 4-10 марта, 5-15 кун давомида. Зарурати бўлганида бир ойдан кейин даволаш курси қайтарилади.

Ножўя таъсирлари

Аллергик реакциялар бўлиши мумкин.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Препаратни компонентларига индивидуал ўзлаштираолмаслик, қандли диабетда қўллаш мумкин эмас.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Аниқланмаган.

Махсус кўрсатмалар

Аллергик реакциялар ривожланганида даволашни тўхтатиш керак.

Эҳтиёткорлик чоралари

Аллергик реакциялар ривожланган ҳолларда дори воситасини бекор қилиш, антигистамин препаратларни буюриш лозим.

Ҳомиладорлик ва лактация даври

Ҳомиладорларда ва лактация даври препаратни қабул қилгандаги хавфсизлиги исботланмаган.

Автомобилни ва бошқа механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири

Препарат автомобиль ёки бошқа техника воситаларини бошқариш қобилиятига таъсир қилмайди.

Дозани ошириб юборилиши

Симптомлари: енгил кўнгил айланиши.

Даволаш: препаратни бекор қилиш.

Чиқарилиш шакли

6, 10 таблеткадан контур уясиз ўрамда, 10 дан уяли ўрамда тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан бирга.

Сақлаш шароити

Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда. Препарат болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилик муддати

2 йил.

Яроқлилик муддати ўтгач ишлатилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи:

"RADIKS" МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., 100054, Лутфий кўч., 50.

Тел.: (+99871) 273-92-31, факс: (+99871) 273-80-58.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситаларининг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили:

"RADIKS" МЧЖ, Тошкент ш. Лутфий кўч., 50.

Тел.: (+99871) 273-43-98, факс (+99871) 273-80-58.