



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ МАЗЬ БОРНАЯ 5%

Торговое название препарата: Мазь борная 5 %

Действующее вещество (МНН): борная кислота

Лекарственная форма: мазь 5 %

Состав:

активное вещество: борная кислота – 5 г;

вспомогательное вещество: вазелин медицинский.

Описание: мазь от белого до желтого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое и дезинфицирующее средство

Код АТХ: D08AD

Фармакологические свойства

Оказывает антисептическое и противопедикулезное действие.

Показания к применению

В качестве антисептического и противопедикулезного средства.

Способ применения и дозы

Мазь наносят на волосистую часть головы по 10-15-25 г (в зависимости от степени зараженности, густоты и длины волос), через 20-30 мин смывают теплой проточной водой с применением мыла.

Побочные действия

При передозировке и длительном применении, а также при нарушении функции почек возможно возникновение острых и хронических токсических реакций (тошнота, рвота, диарея, сыпь, головная боль, спутанность сознания, судороги, олигурия, шок).

Противопоказания

Нарушения функции почек, обработка молочных желез перед кормлением ребенка, беременность, повышенная чувствительность к препарату, детский возраст (в том числе новорожденные). Препарат не следует наносить на обширные поверхности тела.

Особые указания

Мазь нельзя наносить на покрытые волосяные участки при острых воспалительных кожных заболеваниях. Следует избегать попадания мази в глаза.

Применение при беременности и в период лактации

Нет достаточных данных относительно применения беременным женщинам. Данные относительно экскреции в грудное молоко и его действие на плод неизвестны. Поэтому в период беременности или кормления грудью препарат назначают только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Исследования по влиянию на способность управлять транспортным средством и работу с механизмами не проводились.

Передозировка

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Форма выпуска

В банках (флаконах) по 20 г, 25 г, 50 г и в тубах, по 30 г, 40 г вместе с инструкцией по медицинскому применению.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

ООО «RADIKS»

Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

ООО «RADIKS»,

г. Ташкент, 100054, ул. Лутфий, 50.

Тел.: (+99871) 273-43-98, факс (+99871) 273-80-58.

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА **5% БОР СУРТМАСИ**

Препаратнинг савдо номи: 5 % Бор суртмаси

Таъсир этувчи модда (ХПН): борат кислотаси

Дори шакли: 5 % ли суртма

Таркиби:

фаол модда: борат кислотаси – 5 г;

ёрдамчи модда: тиббий вазелин.

Таърифи: оқдан сарғиш ранглигача бўлган, ҳидсиз суртма.

Фармакотерапевтик гуруҳи: антисептик ва дезинфекцияловчи восита

АТХ коди: D08AD

Фармакологик хусусиятлари

Антисептик ва педикулёзга қарши таъсирга эга.

Қўлланилиши

Антисептик ва педикулёзга қарши восита сифатида қўлланилади.

Қўллаш усули ва дозалари

Суртма бошга 10-15-20 г (касалликни юқиш даражаси сочни қалинлиги, узунлигига қараб), миқдорида суртилади ва 20-30 минутдан кейин илиқ оқова сув билан совунлаб ювилади.

Ножўя таъсирлари

Борат кислотаси суртмасининг дозаси ошириб юборилганда ёки узоқ вақт қўлланганда, шунингдек буйрак функцияси бузилганда ўткир ва сурункали захарли реакциялар (кўнгил айнаши, қусиш, диарея, тошма, бош оғриғи, онгни чалкашиши, тиришишлар, олигурия, шок) юз бериши мумкин.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Буйрак функцияси бузилганда, эмизидан олдин сут безларига ишлов бериш ҳомиладорликда, препаратга юқори сезувчанликда, болаларда (жумладан янги туғилган чақалоқларда) қўллаш мумкин эмас. Препаратни тананинг катта юзасига суртиш мумкин эмас.

Махсус кўрсатмалар

Терининг ўткир яллиғланиш касалликларида суртмани сочли жойларга суртиш мумкин эмас. Суртмани кўзга тушишидан сақланиш керак.

Ҳомиладорлик ва лактация даврида қўлланиши

Ҳомиладор аёлларда қўллаш бўйича етарли маълумотлар йўқ. Кўкрак сутига ажралиши ва уни ҳомилага таъсири ҳақида маълумотлар номаълум. Шунинг учун, ҳомиладорлик ва эмизиш даврида препарат фақат она учун кутилган фойда ҳомила учун потенциал хавфдан устун бўлган ҳоллардагина буюрилади.

Автомобилни ва мураккаб механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири

Транспорт воситасини бошқариш ва механизмлар билан ишлаш қобилиятига таъсири бўйича тадқиқотлар ўтказилмаган.

Дозани ошириб юборилиши

Препаратининг дозасини ошириб юборилиши ҳоллари ҳақида хабар берилмаган.

Чиқарилиш шакли

20 г, 25 г, 50 г дан банкаларда (флаконларда) ва 30 г, 40 г дан тубаларда тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан бирга.

Сақлаш шароити

Ёруғликдан химояланган жойда, 25° С дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.
Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилиқ муддати

2 йил.

Яроқлилиқ муддати ўтгач қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи

“RADIKS” МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситаларининг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили:

"RADIKS" МЧЖ,

Тошкент ш. Лутфий кўч., 50.

Тел.: (+99871) 273-43-98, факс (+99871) 273-80-58.