



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ МЕДАМИН

Торговое название препарата: Медамин

Действующее вещество (МНН): медамин (2-метоксикарбониламинобензимидазол)

Лекарственная форма: таблетки

Состав:

одна таблетка содержит:

активное вещество: медамин (карбендацим) – 100 мг;

вспомогательные вещества: сахар молочный, крахмал картофельный, кислота стеариновая.

Описание: таблетки белого или белого с кремоватым или розоватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа: антигельминтное средство.

Код АТХ: P02CA01

Фармакологические свойства

Обладает широким спектром противогельминтного действия в отношении кишечных нематод. Препарат проявляет более высокую активность по отношению к личиночной стадии, чем к половозрелым особям нематод. Проникает через оболочку гельминта и парализует его мускулатуру, в результате чего тот теряет способность фиксироваться в кишечнике. Установлена прямая зависимость противонематодной активности медамина от его дозировки – с увеличением суточной дозировки эффект препарата повышается.

Фармакокинетика

При введении почти не всасывается из ЖКТ и выводится с фекалиями в неизменном виде.

Показания к применению

Препарат применяют для лечения кишечных нематодозов, вызванных аскаридами (аскаридоз), анкилостомидами (анкилостомидоз), острицами (энтеробиоз), трихоцефалёз, стронгилоидоз.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям назначают внутрь, сразу после еды, из расчета 10 мг/кг массы тела в сутки. Курс лечения один день при энтеробиозе и три дня при остальных нематодозах. Таблетки разжевывают, запивают небольшим количеством воды. Слабительное после приема препарата не назначают. Специальной диеты не требуются.

В зависимости от массы тела назначают следующие дозы:

Масса тела больного (кг)	Количество таблеток в сутки	Количество мг в сутки
10	1	100
20	2	200
30	3	300
40	4	400
50	5	500
60 и выше	6	600

Побочные действия

Возможны тошнота, небольшая слабость, аллергические явления в виде зуда и высыпаний на коже. Как правило, побочные реакции слабо выражены и не требуют специального

лечения. При аллергических явлениях применение препарата прекращают. При высокоинтенсивной инвазии редко возможна ретроградная миграция аскарид.

Противопоказания

Выраженные нарушения функции печени, беременность, лактация (грудное вскармливание), индивидуальная непереносимость препарата, повышенная чувствительность к медамину.

Лекарственные взаимодействия

Неизвестно.

Особые указания

При длительном применении необходимо контролировать картину периферической крови, функции печени.

В течение суток после приема медамина не допускать употребления алкоголя.

После приема медамина не применять слабительное.

Обязательно периодическое исследование мазков анальной области и кала после окончания лечения (терапия считается эффективной при отсутствии гельминтов или их яиц в течение семи последующих дней).

Передозировка

Не представлены.

Форма выпуска

Таблетки по 100 мг в упаковке по 10 штук в контурные безъячейковые, контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель:

ООО «RADIKS»,

Республика Узбекистан, 100054, г. Ташкент, ул. Лутфий, 50.

Тел.: (+99871) 273-92-31, факс: (+99871) 273-80-58.

Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

ООО «RADIKS»,

Республика Узбекистан, 100054, г. Ташкент, ул. Лутфий, 50

Тел.: (+99871) 273-43-98, факс: (+99871) 273-80-58.

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА МЕДАМИН

Препаратнинг савдо номи: Медамин

Таъсир этувчи модда (ХПН): медамин (2-метоксикарбониламинобензимидазол)

Дори шакли: таблеткалар

Таркиби:

бир таблетка қуйидагиларни сақлайди:

фаол модда: медамин (карбендацим) – 100 мг;.

ёрдамчи моддалар: сут қанди, картошка крахмали, стеарин кислотаси.

Таърифи: оқ рангли ёки оқ сарғиш ёки қизғиш тусли бўлган таблеткалар.

Фармакотерапевтик гуруҳи: антигельминт восита.

Код АТХ: P02CA01

Фармакологик хусусиятлари

Ичак нематодаларига нисбатан гельминтларга қарши кенг таъсир доирасига эга. Препарат жинсий жихатдан етилган нематодаларга қараганда, личинка босқичидагиларга юқорироқ фаолликни намоён қилади. Гельминтнинг қобиғи орқали ўтади ва унинг мушакларини фалажлайди, натижада у ичакда фиксация бўлиш қобилятини йўқотади. Медаминнинг нематодаларга қарши фаоллиги, унинг дозаси билан бевосита боғлиқлиги аниқланган – суткалик доза ошган сари, препаратнинг самараси ҳам ошади.

Фармакокинетикаси

Юборилганда меъда-ичак йўлларида деярли сўрилмайди ва ахлат орқали ўзгармаган ҳолда чиқарилади.

Қўлланилиши

Препарат аскаридалар (аскаридоз), анкилостомидлар (анкилостомидоз), острицалар (энтеробиоз), трихоцефалёз, стронгилоидозлар чақирган ичак нематодозаларини даволаш учун қўлланади.

Қўллаш усули ва дозалари

Катталар ва болаларга овқатдан кейин, суткада тана массасининг 10 мг/кг нисбатида ичга қабул қилиш учун буюрилади. Даволаш курси энтеробиозда бир кун ва бошқа нематодозаларда уч кун. Таблеткалар чайналади ва озгина микдордаги сув билан ичилади. Препарат қабул қилингандан кейин сурги воситаси буюрилмайди. Махсус парҳез талаб этилмайди.

Тана вазнига кўра қуйидаги дозалар буюрилади:

Беморнинг тана вазни (кг)	Суткада таблеткалар сони	Суткадаги микдори (мг)
10	1	100
20	2	200
30	3	300
40	4	400
50	5	500
60 ва юқори	6	600

Ножўя таъсирлари

Кўнгил айнаши, кучсиз ҳолсизлик, терида қичишиш ва тошма кўринишидаги аллергия ҳолатлар бўлиши мумкин. Одатда, ножўя реакциялари сусти сезилади ва махсус даволашни талаб қилмайди. Аллергия ҳолатлар юз берганда препаратни қўллаш тўхтатилади. Юқори интенсив инвазияда, кам ҳолларда аскаридаларни ретроград миграцияси кузатилиши мумкин.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Жигар функциясининг яққол бузилишлари, ҳомиладорлик, лактация (эмишиш), препаратни индивидуал ўзлаштираолмаслик, медаминга юқори сезувчанликда қўллаш мумкин эмас.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Номаълум.

Махсус кўрсатмалар

Узоқ муддат қўлланганда периферик қон манзарасини, жигар функциясини назорат қилиш лозим.

Медамин қабул қилингандан кейин бир сутка давомида алкоголь истеъмол қилишга йўл қўймаслик керак. Медамин қабул қилингандан кейин сурги воситаси қўлланилмасин.

Даволаш тугагандан кейин анал соҳасидан олинган суртмалар ва ахлатни вақти-вақти билан текшириш зарур (охирги етти кун давомида гельминтлар ёки уларнинг тухумлари йўқ бўлганда даволаш самарали ҳисобланади).

Дозани ошириб юборилиши

Тақдим қилинмаган.

Чиқарилиш шакли

100 мг дан таблеткалар 10 донадан контур уясиз, контур уяли ўрамда тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан бирга.

Сақлаш шароити

Қурук, ёруғликдан ҳимояланган жойда, 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин. Препарат болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилик муддати

3 йил.

Ўрамида кўрсатилган яроқлилик муддати ўтганидан кейин ишлатилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецепт бўйича.

Ишлаб чиқарувчи:

“RADIKS” МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси, 100054, Тошкент ш., Лутфий кўч, 50.

Тел.: (+99871) 273-92-31, факс: (+99871) 273-80-58.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситаларининг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили:

"RADIKS" МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси, 100054, Тошкент ш. Лутфий кўч., 50

Тел.: (+99871) 273-43-98, факс: (+99871) 273-80-58.