



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ НАСТОЙКА ЖЕНЬШЕНЯ

**Торговое название препарата:** Настойка женьшеня

**Действующее вещество (МНН):** женьшень

**Лекарственная форма:** настойка

**Состав:**

*активное вещество:* корень женьшеня крупноизмельченного – 100 г;

*вспомогательное вещество:* спирт этиловый медицинский 70% - до получения 1 л настойки.

**Описание:** прозрачная жидкость желтоватого цвета, со специфическим запахом. В процессе хранения допускается выпадение осадка.

**Фармакотерапевтическая группа:** общее тонизирующее средство

**Код АТС:** A13A

### Фармакологические свойства

Обладает тонизирующим действием на центральную нервную систему. Улучшая динамику процесса возбуждения и торможения в коре головного мозга, усиливает тонус организма при общем ослаблении вследствие перенесенных заболеваний, перенапряжения. Повышает выносливость при физических и психических нагрузках.

### Показания к применению

Лечение переутомления, неврастения, астении после перенесенных инфекционных и истощающих заболеваний, ослабления половой функции на почве неврастения (в составе комплексной терапии).

### Способ применения и дозы

Внутрь, за 30-40 минут до еды в дозе 15-25 капель 2-3 раза в день. Курс лечения 30-40 дней. По показаниям повторные курсы лечения осуществляются через 2-3 недели.

### Побочные действия

При повышенной чувствительности к препарату развивается зуд и генерализованная розеолезная кожная сыпь.

### Противопоказания

Гипертоническая болезнь, повышенная возбудимость, бессонница, кровоточивость, сердечная недостаточность, повышенная чувствительность к препарату.

### Лекарственные взаимодействия

Усиливает действие психостимуляторов и аналептиков (в т.ч. кофеина, камфоры и др.). Проявляет антагонизм при взаимодействии с лекарственными средствами, угнетающими центральную нервную систему (противоэпилептические препараты, нейролептики, транквилизаторы и седативные средства). Усиливает действие гипогликемических лекарственных средств. Усиливает действие варфарина. Повышает риск развития резистентности к петлевым диуретикам.

**Особые указания**

Препарат не следует применять в конце дня во избежание нарушения сна. Следует иметь в виду что, прием препарата наиболее эффективен осенью и зимой.

**Передозировка**

При передозировке могут наблюдаться головная боль и головокружение, бессонница, тошнота, рвота, повышение температуры. При отравлении – нарушение дыхания, потеря сознания. Характерным симптомом интоксикации является кровоточивость, в том числе проявляющаяся кровавым поносом, рвотой.

**Форма выпуска**

Жидкость во флаконах (банках), по 25 мл, 40 мл, 50 мл в картонной пачке вместе с инструкцией по медицинскому применению.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель**

ООО «RADIKS»,

Республика Узбекистан, 100054, г. Ташкент, ул. Лутфий, 50.


Тел.: (+99871) 273-92-31, факс: (+99871) 273-80-58.

**Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:**

ООО «RADIKS»,

Республика Узбекистан, 100054, г. Ташкент, ул. Лутфий, 50.

Тел.: (+99871) 273-43-98, факс: (+99871) 273-80-58.



## ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА ЖЕНЬШЕН НАСТОЙКАСИ

**Препаратнинг савдо номи:** Женьшен настойкаси

**Таъсир этувчи модда (ХПН):** женьшень

**Дори шакли:** настойка

**Таркиби:**

*фаол модда:* катта-катта қилиб майдаланган женьшен илдизи- 100 г;

*ёрдамчи модда:* 70% ли тиббиёт этил спирти – 1 л настойка олингунча.

**Таърифи:** тиниқ, сариқ рангли, ўзига хос хидли суюқлик. Сақлаш жараёнида чўкмага йўл қўйилади.

**Фармакотерапевтик гуруҳи:** умумий тонусни оширувчи восита

**АТХ коди:** A13A

### Фармакологик хусусиятлари

Марказий нерв тизимини тонусни оширувчи таъсирга эга. Бош мия пўстлоғида қўзғалиш ва тормозланиш жараёнлари динамикасини яхшилаб, ўтказилган касалликларни, зўриқиш натижасида умумий ҳолсизланган организмнинг тонусини кучайтиради. Жисмоний ва рухий юкланишларга чидамлилиқни оширади.

### Қўлланилиши

Толиқиш, неврастения, ўтказилган юқумли ва ҳолдан тойдирадиган касалликлардан кейинги астениялар, неврастения натижасидаги жинсий функциянинг сусайишини (комплекс даволаш таркибида) даволашда қўлланади.

### Қўллаш усули ва дозалари

Овқатдан 30-40 минут олдин 15-25 томчидан кунига 2-3 марта ичга қабул қилинади. Даволаш курси 30-40 кун. Зарурати бўлганида такрорий даволаш курси 2-3 ҳафтадан сўнг амалга оширилади.

### Ножўя таъсирлари

Препаратга юқори сезувчанликда бутун терида тарқалган розеолёз тошмалар ривожланади.

### Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Гипертония касаллиги, юқори қўзғалувчанлик, уйқусизлик, қонаши, юрак етишмовчилиги, препаратга бўлган юқори сезувчанликда қўллаш мумкин эмас.

### Дориларнинг ўзаро таъсири

Психостимуляторлар ва аналептиклар (жумладан кофеин, камфора ва бошқалар) таъсирини кучайтиради. Марказий нерв тизимини сусайтирадиган (антиэпилептик препаратлар, нейролептиклар, транквилизаторлар ва седатив воситалар) билан ўзаро таъсирда антагонизмни намоён қилади. Гипогликемик дорилар таъсирини кучайтиради. Варварин таъсирини кучайтиради. Халқали диуретикларга нисбатан резистентлиги ривожланиш хавфини оширади.

**Махсус кўрсатмалар**

Уйку бузилишини олдини олиш мақсадида препаратни кун охирида қўлламаган маъқул. Препаратни кузда ва қишда қўллаш юқори самарали эканлигини эътиборга олиш керак.

**Дозани ошириб юборилиши**

Доза ошириб юборилганида бош оғриғи ва бош айланиши, уйқусизлик, кўнгил айланиши, қусиш, тана ҳароратининг кўтарилиши кузатилиши мумкин. Заҳарланганда – нафасни бузилиши, ҳушдан кетиш қўзатилади. Қонашлар заҳарланишнинг характерли симптоми бўлиб, жумладан қон аралаш ич кетиш, қусиш кузатилиши мумкин.

**Чиқарилиш шакли**

Суюқлик 25 мл, 40 мл, 50 мл дан флаконларда (банкаларда) картон қутида тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан бирга.

**Сақлаш шароити**

Ёруғликдан ҳимояланган жойда, 25<sup>0</sup>С дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин. Препарат болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

**Яроқлилиқ муддати**

3 йил.

Яроқлилиқ муддати ўтгач ишлатилмасин.

**Дорихоналардан бериш тартиби**

Рецептсиз.

**Ишлаб чиқарувчи:**

“RADIKS” МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси, 100054, Тошкент ш., Лутфий кўч, 50.

Тел.: (+99871) 273-92-31, факс: (+99871) 273-80-58.

**Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситаларининг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили:**

"RADIKS" МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси, 100054, Тошкент ш. Лутфий кўч., 50.

Тел.: (+99871) 273-43-98, факс: (+99871) 273-80-58.