



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ СЕНАДЕКСИН

**Торговое название препарата:** Сенадексин

**Действующее вещество (МНН):** сеннозиды А и В (форме солей кальция).

**Лекарственная форма:** таблетки

**Состав:**

одна таблетка содержит:

*активное вещество:* сухого экстракта листьев сенны [(александрийского листа, содержащего 20% сеннозидов кальция А и В, (суммарно)] – 70 мг, в пересчете на 100% содержание сеннозидов кальция А и В – 14 мг.

*вспомогательные вещества:* сахар молочный (лактоза), крахмал кукурузный, ванилин, магния стеариновоокислого или кальция стеариновоокислого, нипагин, стеариновая кислота.

**Описание:** таблетки от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с вкраплениями, с запахом ванилина.

**Фармакотерапевтическая группа:** слабительное средство

**Код АТХ:** А06АВ06

### Фармакологические свойства

#### Фармакодинамика

Оказывает слабительное действие, наступающее через 8-10 часов после приема препарата. Эффект обусловлен действием на рецепторы толстого кишечника, что приводит к усилению перистальтики. Избирательно влияет на ободочную кишку, восстанавливает нормальное функционирование кишечника, не вызывает привыкания, не влияет на пищеварение.

#### Фармакокинетика

Действующие начала препарата частично всасываются в тонком кишечнике и выделяются в толстом, а частично освобождаются непосредственно в толстом кишечнике под влиянием бактериальной флоры. Выводится из организма с калом и мочой.

### Показания к применению

Спастические и атонические запоры различной этиологии, в том числе обусловленные гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки. Регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах.

### Способ применения и дозы

Внутрь, вечером после еды по 1 таблетке. При отсутствии эффекта через несколько дней разовую дозу можно увеличить до 2-3 таблеток.

### Побочные действия

Коликообразные боли в животе, диарея, метеоризм. В этих случаях необходимо уменьшить дозу или отменить препарат. При длительном применении, особенно в больших дозах, возможны потери электролитов, в основном калия, альбуминурия, гематурия, отложение меланина в слизистой оболочке кишечника, повреждение межмышечного сплетения.

### Противопоказания

Спастический колит, аппендицит, кишечная непроходимость, боли в животе неясного генеза, нарушение водного и электролитного обмена, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, перитонит, кровотечение из желудочно-кишечного тракта, маточные кровотечения, цистит.

### **Лекарственные взаимодействия**

При длительном применении препарата в высоких дозах возможно усиление действия сердечных гликозидов и влияние на действие антиаритмических препаратов в связи с возможностью развития гипокалиемии. При одновременном применении с тиазидными диуретиками, глюкокортикоидами, препаратами корня солодки увеличивается риск развития гипокалиемии. Нарушает абсорбцию антибиотиков тетрациклинового ряда.

### **Особые указания**

С осторожностью назначают при заболеваниях печени, почек, в период беременности и лактации. Иногда при приеме препарата наблюдается изменение окраски мочи, что не имеет клинического значения.

#### *Беременность и период лактации*

Безопасность применения препарата у беременных не доказана. Назначение не рекомендовано из-за риска развития абдоминальных болей, диареи, спазмов кишечника.

#### *Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами*

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем или другими техническими средствами.

### **Передозировка**

Превышение терапевтических доз сопровождается сильной диареей с развитием водно-электролитного дисбаланса. Препарат отменяется, проводится назначение симптоматических лекарственных средств.

### **Форма выпуска**

По 6, 10 таблеток в контурно-безячейковой упаковке, по 10 таблеток в контурно-ячейковой упаковке вместе с инструкцией по медицинскому применению.

### **Условия хранения**

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.  
Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.

Не следует его использовать после истечения срока годности

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Производитель**

ООО «RADIKS»,

Республика Узбекистан, 100054, г. Ташкент, ул. Лутфий, 50.


Тел.: (+99871) 273-92-31, факс: (+99871) 273-80-58.

### **Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:**

ООО «RADIKS»,

Республика Узбекистан, 100054, г. Ташкент, ул. Лутфий, 50.

Тел.: (+99871) 273-43-98, факс: (+99871) 273-80-58.



## ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА СЕНАДЕКСИН

**Препаратнинг савдо номи:** Сенадексин

**Таъсир этувчи модда (ХПН):** А ва В сеннозидлар (кальций тузлари шаклида).

**Дори шакли:** таблеткалар

**Таркиби:**

бир таблетка қуйидагиларни сақлайди:

*фаол модда:* сано баргларини куруқ экстракти [(20% А ва В кальций сеннозидларини сақловчи александр барги, (жамланган)] – 70 мг, А ва В кальций сеннозидларга 100% қайта ҳисобланганда – 14 мг.

*ёрдамчи моддалар:* сут қанди (лактоза), маккажўхори крахмали, ванилин, магний стеарин кислотаси ёки кальций стеарин кислотаси, нипагин, стеарин кислотаси.

**Таърифи:** оч жигаррангдан тўқ жигаррангача, ванилин ҳидли доғлари бўлган таблеткалар.

**Фармакотерапевтик гуруҳи:** сурги восита

**АТХ коди:** А06АВ06

### Фармакологик хусусиятлари

#### Фармакодинамикаси

Препарат қўллангандан сўнг 8-10 соатдан кейин сурги таъсирини кўрсатади. Препаратни бу хусусияти, йўғон ичак рецепторларига таъсири натижасида ичак перистальтикасини кучайтириши билан ифодаланади. Чамбар ичакка танлаб таъсир кўрсатади, ичакни нормал функциясини тиклайди, препаратга қарамлилик чақирмайди ва овқатни ҳазм қилишга таъсир кўрсатмайди.

#### Фармакокинетикаси

Препаратнинг таъсир этувчи моддалари қисман ингичка ичакда сўрилади ва йўғон ичакда ажралиб чиқади, бир қисми эса бактерия флоралари таъсири натижасида айнан йўғон ичакда ажралиб чиқади. Организмдан сийдик ва ахлат билан чиқиб кетади.

### Қўлланилиши

Препаратни турли этиологияли спастик ва атоник қабзиятларда, шу жумладан йўғон ичак перистальтикасини гипотониясида ва сусайишида қўлланилади. Ич келишини тартибга солиш мақсадида геморройда, проктит, анал ёриқларида қўлланилади.

### Қўллаш усули ва дозалари

Препаратни кечки овқатдан кейин 1 таблеткадан ичга қабул қилинади. Самара бўлмаганида, бир неча кундан сўнг бир марталик дозасини 2-3 таблеткагача ошириш мумкин.

### Ножўя таъсирлари

Қоринда санчиксимон оғриқлар, диарея, метеоризм кузатилиши мумкин. Бундай ҳолатларда дозани камайтириш ёки препаратни бекор қилиш лозим. Узоқ муддат қўлланганда, айниқса катта дозаларда, электролитларни йўқолиши, асосан калий, альбуминурия, гематурия, ичак шиллиқ қаватида меланинни тўпланиши ва мускуллараро боғланишларни бузилиши кузатилиши мумкин.

### **Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар**

Спастик колит, кўричак, ичакни тутилиши, ноаниқ генезли қориндаги оғриқлар, сув ва электролит алмашинуви бузилиши, қисилган чурра, қорин бўшлиғи аъзоларини ўткир яллиғланиш касалликлари, перитонит, меъда-ичак йўлидан ва бачадондан қон кетишлари, циститда қўллаш мумкин эмас.

### **Дориларнинг ўзаро таъсири**

Препаратни юқори дозаларда узоқ муддат қўлланганда юрак гликозидлари таъсирини кучайтиради ва гипокалиемия ривожланиш эҳтимоли билан боғлиқ бўлган антиаритмик препаратларга таъсир этади. Тиазид диуретиклар, глюкокортикоидлар, қизил мия илдизи препаратлари билан бир вақтда қўлланганда гипокалиемия ривожланиш хавфи ошади. Тетрациклин қатори антибиотикларини сўрилиши бузилади.

### **Махсус кўрсатмалар**

Жигар, буйрак касалликларида, ҳомиладорлик ва лактация даврида эҳтиёткорлик билан буюрилади. Баъзан препаратни қабул қилганда сийдикни ранги ўзгариши мумкин, буни клиник аҳамияти йўқ.

*Ҳомиладорлик ва лактация даврида қўлланилиши*

Ҳомиладорларда препаратни қабул қилгандаги хавфсизлиги исботланмаган. Абдоминал оғриқ, диарея, ичаклар спазмини ривожланиш хавфи бўлганлиги учун буюриш тавсия этилмайди.

*Автомобилни ва бошқа механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири*

Препарат автомобиль ёки бошқа техника воситаларини бошқариш қобилиятига таъсир қилмайди.

### **Дозани ошириб юборилиши**

Терапевтик дозани ошириб юборилиши кучли диарея сув-электролит дисбалансини ривожланиши билан кечади. Препаратни бекор қилиб, симптоматик дори воситаларини буюриш керак.

### **Чиқарилиш шакли**

6, 10 таблеткалардан контур -уясиз ўрамда, 10 таблеткалардан контур уяли ўрамда тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан бирга.

### **Сақлаш шароити**

Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин. Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

### **Яроқлилиқ муддати**

3 йил.

Яроқлилиқ муддати ўтгач ишлатилмасин.

### **Дорихоналардан бериш тартиби**

Рецептсиз.

### **Ишлаб чиқарувчи**

«RADIKS» МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., 100054, Лутфий кўч. 50.

Тел.: (+99871) 273-92-31, факс: (+99871) 273-80-58.

**Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситаларининг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили:**

"RADIKS" МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., 100054, Лутфий кўч., 50.

Тел.: (+99871) 273-43-98, факс (+99871) 273-80-58.