



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЦИННАРИЗИН

Торговое название препарата: Циннаризин

Действующее вещество (МНН): циннаризин

Лекарственная форма: таблетки

Состав:

активное вещество: циннаризин - 25 мг

вспомогательные вещества: лактоза (сахар молочный), крахмал картофельный, тальк, стеариновая кислота или кальция стеарат.

Описание: таблетки от белого до белого с кремоватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Средства для лечения нарушений мозгового кровообращения и мигрени.

Код АТХ: N07CA02

Фармакологические свойства

Блокатор кальциевых каналов. Нарушает поступление ионов кальция в клетки сосудов и уменьшает содержание кальция в депо плазмолемм (сарколемм). Оказывает непосредственное спазмолитическое влияние на гладкие мышцы сосудов. Увеличивает мозговой кровоток и снижает сопротивление мозговых сосудов. Уменьшает реакцию сосудов на биогенные сосудосуживающие вещества. Повышает устойчивость тканей к гипоксии. Не оказывает существенного влияния на системное артериальное давление. Обладает противогистаминной активностью. Уменьшает возбудимость вестибулярного аппарата.

Фармакокинетика

После приема внутрь максимальная концентрация ($C_{\max}$) в плазме отмечается через 1-3 часа. 91% связывается с белками плазмы. Полностью метаболизируется. Период полувыведения ($T_{1/2}$) составляет 4 часа. Выделяется в виде метаболитов с мочой (1/3) и с калом (2/3).

Показания к применению

Лечение нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу; остаточных явлений нарушений мозгового кровообращения, черепно-мозговых травм, дисциркуляторной энцефалопатии, в частности, при церебральном атеросклерозе, мигрени (профилактика её приступов), парестезий, ночных болей в конечностях, трофических нарушений, облитерирующих заболеваний нижних конечностей, в том числе «перемежающейся хромоты», болезни Меньера, болезни Рейно, а также как поддерживающая терапия при вестибулярных расстройствах (головокружение, шум в ушах, нистагм, тошнота, рвота лабиринтного происхождения).

Способ применения и дозы

Принимают после еды, не разжевывая, запивают водой. Обычная дозировка по 25-75 мг (1-3 таблетки) 3 раза в день. При высокой чувствительности к препарату лечение начинают с 1/2 дозы, постепенно её увеличивая. Курс лечения от нескольких недель до нескольких месяцев. При морской и воздушной болезни принимают 1 таблетку за 1 час до поездки. Через 6-8 часов можно принять ещё 1 таблетку.

Побочные действия

Со стороны нервной системы: сонливость, повышенная утомляемость, при очень длительном применении - поражение периферических нервов, появление экстрапирамидных расстройств.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: сухость во рту, диспепсические явления, редко - холестатическая желтуха.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: при предрасположенности - артериальная гипотония.

Аллергические реакции: виде кожной сыпи. Может наблюдаться увеличение массы тела, усиление потоотделения, красный плоский лишай.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, период беременности и лактации.

Лекарственные взаимодействия

Усиливает эффекты ноотропных и антигипертензивных средств, а также препаратов, оказывающих угнетающее влияние на центральную систему.

Особые указания

В начале приема следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания, быстрых психических и двигательных реакций. При длительном применении рекомендуется проведение контроля за функцией печени, почек, картиной периферической крови.

С осторожностью назначают препарат больным с паркинсонизмом, артериальной гипотонией. Во время лечения не следует употреблять алкоголь.

Передозировка

Симптомы: сонливость, рвота, тремор, гипотензия, кома.

Лечение: специфического антидота нет. Промывание желудка, назначение активированного угля, симптоматическая терапия.

Форма выпуска

Таблетки по 25 мг, по 10 штук в контурно ячейковых и безячейковых упаковках.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Препарат хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель:

ООО «RADIKS»,

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100054, ул. Лутфий, 50.

Тел.: (+99871) 273-80-58, Факс: (+99871) 273-92-31.

Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

ООО «RADIKS», Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100054, ул. Лутфий, 50.

Тел.: (+99871) 273-92-31, факс(+99871) 273-80-58.

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА ЦИННАРИЗИН

Препаратнинг савдо номи: Циннаризин

Таъсир этувчи модда (ХПН): циннаризин

Дори шакли: таблеткалар

Таркиби:

фаол модда: циннаризин – 25 мг.

ёрдамчи моддалар: лактоза (сут шакари), картошка крахмали, тальк, стеарин кислотаси ёки кальций стеарати.

Таърифи: оқдан оқ оч сариқ тусли ранглигача бўлган таблеткалар.

Фармакотерапевтик гуруҳи: Бош мия қон айланишининг бузилишлари ва мигренни даволаш учун воситалар.

АТХ коди: N07CA02

Фармакологик хусусиятлари

Кальций каналларининг блокаторидир. Кальций ионларини томирларнинг хужайраларига киришини бузади ва плазмолеммалар (сарколемма) депосида кальций миқдорини камайтиради. Томирларнинг силлиқ мушакларига тўғридан-тўғри спазмолитик таъсир кўрсатади. Бош мия қон оқимини оширади ва бош мия қон-томирларининг қаршилигини пасайтиради. Томирларнинг торайтирувчи биоген моддаларга бўлган реакциясини камайтиради. Тўқималарнинг гипоксияга бўлган чидамлилигини оширади. Тизимли артериал босимга сезиларли даражада таъсир кўрсатмайди. Гистаминга қарши фаолликка эга. Вестибуляр аппаратининг қўзғалувчанлигини камайтиради.

Фармакокинетикаси

Циннаризин ичга қабул қилингандан кейин 1-3 соат ўтгач қон плазмасида максимал концентрацияси (C_{max}) аниқланади. Плазма оқсиллари билан 91% боғланади. Тўлиқ метаболизмга учрайди. Ярим чиқарилиш даври ($T_{1/2}$) 4 соатни ташкил қилади. Организмдан метаболитлар кўринишида сийдик (1/3) ва ахлат билан (2/3) чиқарилади.

Қўлланилиши

Ишемик тури бўйича бош мия қон айланишининг бузилишларни даволаш; бош мия қон айланиши бузилишларининг қолдиқ кўринишлари, бош суяги жароҳатлари, дисциркулятор энцефалопатия, хусусан, церебрал атеросклероз, мигрен (унинг ҳужайраларининг олдини олиш), парестезиялар, оёқ-қўлларнинг тунги оғриқлари, трофик бузилишлари, оёқларнинг облитерирловчи касалликлари, шу жумладан «ўзгариб турадиган оқсоқликни», Меньер касаллиги, Рейно касаллигини даволаш, шунингдек вестибуляр бузилишларда самарани бир маромда ушлаб турувчи даволаш сифати (бош айланиш, кулоқларда шовқин, нистагм, кўнгил айниши, лабиринтни келиб чиқиши сабабли қусиш) да қўлланилади.

Қўллаш усули ва дозалари

Овқатдан кейин, чайнамасдан, сув билан қабул қилинади. Одатдаги дозаси 25-75 мг дан (1-3 таблетка) кунда 3 марта. Препаратга юқори сезувчанликда даволаш $1/2$ дозадан бошланади ва аста-секин оширилади. Даволаш курси бир-неча ҳафтадан то бир-неча ойгача. Денгиз ва ҳаво касаллигида йўлга чиқишдан 1 соат олдин 1 таблетка қабул қилинади. 6 – 8 соатдан кейин яна 1 таблетка қабул қилиш мумкин.

Ножўя таъсирлари

Нерв тизими томонидан: уйқучанлик, юқори чарчоқлик, жуда узоқ муддат қўлланганда периферик нервларнинг шикастланишлари, экстрапирамид бузилишлар намоён бўлади.

Меъда-ичак йўллари томонидан: оғизнинг қуриши, диспептик ҳолатлар, кам ҳолларда – холестатик сариклик.

Юрак-қон томир тизими томонидан: мойилликда - артериал гипотония.

Аллергик реакциялар: тери тошмаси шаклида. Тана вазнининг ошиши, кўп терлаш, қизил ясси темирлатки кузатилиши мумкин.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Препаратга юқори сезувчанлик, ҳомиладорлик ва лактация даврида қўллаш мумкин эмас.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Ноотроп ва антигипертензив воситаларнинг, шунингдек марказий нерв тизимида сусайтирувчи таъсир кўрсатувчи препаратларнинг самарасини кучайтиради.

Махсус кўрсатмалар

Даволашнинг бошида, диққатни юқори талаб қилувчи, тезкор рухий ва ҳаракат реакцияларни талаб қилувчи потенциал хавфли машғулотлар билан шуғулланишдан сақланиш керак. Узоқ муддат қўлланганда жигар, буйрак функцияси, периферик қон манзарасини назорат қилиш тавсия этилади. Паркинсонизм, артериал гипотонияси бўлган беморларга препарат эҳтиёткорлик билан буюрилади. Даволаш вақтида алкоголь истеъмол қилиш мумкин эмас.

Дозанинг ошириб юборилиши

Симптомлари: уйқучанлик, қусиш, тремор, гипотензия, кома.

Даволаш: специфик антидоти йўқ. Меъдани ювиш, фаоллаштирилган кўмирни буюриш, симптоматик даволаш.

Чиқарилиш шакли

25 мг дан таблеткалар, 10 донадан контур уяли, уясиз ўрамларда.

Сақлаш шароити

Қурук, ёруғликдан ҳимояланган жойда, 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда.

Болалар ололмайдиған жойда сақлансин.

Яроқлилиқ муддати

2 йил

Яроқлилиқ муддати ўтгач ишлатилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецепт бўйича.

Ишлаб чиқарувчи

«RADIKS» МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., 100054, Лутфий кўч. 50.

Тел.: (+99871) 273-80-58, факс, (+99871) 273-92-31.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситаларининг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили:

"RADIKS" МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., 100054, Лутфий кўч., 50.

Тел.: (+99871) 273-92-31, факс (+99871) 273-80-58.